

AVERTISSEMENTS 1000 *030410

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 27 du 14/09/2000 - 2 pages

Colza

Stades: très hétérogènes; colzas "non levés" à "4 feuilles"; manque d'eau dans une grande majorité de cas, croûtes de battance dans quelques parcelles.

Ravageurs

- Limaces

Situation calme pour l'instant.

Attention en cas de pluies, car la plupart des parcelles sont encore à un stade sensible.

- Altises

Présentes en culture, notamment en bordure d'anciens champs de colza.

Rappel des seuils d'intervention :

- . De la levée à 2-3 feuilles : 3 plantes sur 10 avec des morsures.
- . Jusqu'au stade 5-6 feuilles : 20 à 30 captures cumulées de grosses altises.

- Tenthrèdes

Populations importantes d'adultes. Les oeufs sont déposés vers le bord de la feuille, entre les deux épidermes, provoquant un renflement à la surface du limbe. La durée d'incubation est de 7 à 10 jours. Seules les larves causent des dégâts (défoliations). Les premières larves sont observées à Dame Marie les Bois (37) et St Loup de Gonois (45).

Attendre l'apparition des larves pour juger de la nécessité d'un traitement.


Produits homologués contre les Tenthrèdes

Composition	Spécialités	Dose/ha	
bifenthrine	Bistar	0,11	
	Brigade	0,11	
	Experid	0,0751	
	Talstar	0,0751	
	Talstar Flo	0,11	
cyperméthrine	Cymbush	0,21	
deltaméthrine -	Décis	0,21	
	Décis Micro	0,08 kg	
	Deltamex 2.5 CE	0,21	
	Pearl	0,21	
	Pearl Micro	0,08 kg	
	Ruitor	0,21	
	Split	0,21	
	Split Micro	0,08 kg	
lambda- cyhalothrine	Euro-Appro I-5	0,11	
	Karaté Vert	0,11	
	Karaté Xpress	0,1 kg	
	Lambda C	0,11	
deltaméthrine + endosulfan	Galion	0,81	

Tenthrède adulte

- Longueur : 6 à 8 mm

- Couleur : rouge-orangé




Larve de Tenthrède

- Longueur : maximum 15-18 mm

- Couleur : gris foncé

- Caractéristiques : 3 paires de pattes thoraciques, 8 paires de fausses pattes abdominales



Pucerons

Des petites colonies sont visibles dans de nombreux sites : Autrèche, Auzouer, La Chapelle Blanche (37), La Chapelotte, Oizon, Cornusse (18), St Loup de Gonois (45). Les pucerons verts sont susceptibles de transmettre des viroses.

A surveiller; observer attentivement sous les feuilles pour pouvoir les détecter.

Rappel du seuil d'intervention : 20 % de plantes porteuses.

Rappelons qu'il existe des résistances du puceron vert aux pyréthrinoïdes.



Nos bulletins sont disponibles sur notre site Internet:

srpv-centre.com Abonnez-vous à cette formule et bénéficiez de

tarifs préférentiels!

Colza

- Limaces : attention a la reprise d'activité en cas de pluie.
- Pucerons : à rechercher sous les feuilles ; 1ères petites colonies observées.
- Phoma : situation calme actuellement.

D.R.A.F. CENTRE Service Régional de la Protection des Vé 93, rue de Curambourg 45404 Fleury les Aubrais Tél. 02.38.22.11.11 Fax 02.38.84.19.79 Mél : srpv1@terre-net.fr

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricode la Région CENTRE Le Directeur-Gérant M. HANRION Publication périodique C.P.P.A.P. n° 80530 ISSN n° 0757-4029 Abonnement: 325 F

P 254

Maladies

- Phoma

Le temps sec stoppe la maturation du champignon : sur l'ensemble des sites d'observations, on note que moins de 25 % des périthèces observés sont "mûrs" (capable de projeter des ascospores). En cas de retour des pluies, la situation peut évoluer rapidement.

Le suivi continue. Pas d'intervention pour le moment.

- Pour info

Des symptômes de mildiou sont observés en Indre et Loire (Autrèche, Auzouer, Chaveignes).

Désherbage

Les repousses de céréales sont fréquentes.

En parcelles infestées, prévoir un traitement antigraminées (pour le choix des produits : voir le tableau ci-dessous).

Maïs: pyrale

Nous recherchons des parcelles fortement infestées par la pyrale afin d'y prélever des cannes pour la réalisation des suivis de printemps (évolution de la nymphose, émergence des papillons). Nous vous remercions de nous contacter si vous connaissez de telles situations.

Tournesol

Début des récoltes.

Désherbage du Colza : traitements de rattrapage antigraminées

Stade du colza	Stades adventices	Produits	Doses/ha
Tous les stades	3 feuilles à début montaison	Eloge Agil Ankor Centurion 240 EC Nabu Extra Fusilade X2 Pilot Stratos Ultra Targa D+	0,5 I 1 I + huile 1,25 I + huile 0,4 I + huile 1,5 I + huile 0,6 I + mouillant 1,2 I 2 I 0,5 I + huile
3 feuilles vraies à reprise de la végétation	a filliona	Kerb Flo	1,2
4-6 feuilles vraies à 3 semaines avant reprise de la végétation		Légurame PM Pradone TS	3 kg 4 kg